

注册商标

OTC 标识

注册商标

复方维 U 颠茄铋铝片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：复方维 U 颠茄铋铝片

英文名称：Compound Vitamin U, Bismuth Subcarbonate and Aluminium Hydroxide Tablets

汉语拼音：Fufang Wei U Dianqie Bi Lu Pian

【成份】本品为复方制剂，双层片每片内层含维生素 U 25 毫克，甘草酸 12.5 毫克；外层含碱式碳酸铋 100 毫克，氢氧化铝 75 毫克，叶绿素铜钠 1.0 毫克，颠茄流浸膏 2.6 毫克，珍珠层粉 100 毫克。辅料为：乳糖、预胶化淀粉、羧甲淀粉钠、聚维酮 K-30、聚维酮 K-90D、微晶纤维素、气相二氧化硅、硬脂酸镁。

【性状】本品为绿色双层片。外层显绿色，内层显类白色至黄棕色并有分散性的棕黑色点。

【作用类别】本品为抗酸及胃黏膜保护类非处方药药品。

【适应症】用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃烧灼感（烧心）、反酸。

【用法用量】口服。成人一次 2~3 片，一日 3 次。

【不良反应】

1. 老年人长期应用会导致骨质疏松。
2. 肾功能不全患者长期应用可能会有铝蓄积中毒，出现精神症状。

【禁忌】

1. 孕妇禁用。
2. 前列腺肥大、青光眼患者禁用。

【注意事项】

1. 本品连续使用不得超过 7 天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 肾功能不全、高血压、心脏病、胃肠道阻塞性疾患、甲状腺功能亢进、溃疡性结肠炎、反流性食管炎患者应在医师指导下使用。
3. 儿童、老年人用量请咨询医师或药师。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其它药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品不能与牛奶同服。
2. 服用本品后应避免服用其他药物，因氢氧化铝能与其他药物结合而影响疗效。
3. 本品可减弱甲氧氯普胺、多潘立酮的作用。
4. 本品与西咪替丁、雷尼替丁等同用，应间隔至少 1 小时，因前者可降低后者的吸收。
5. 本品与肠溶片同服，可使肠溶片加快溶解，不应同用。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品内层中维生素 U 及甘草酸可促进肉芽发育、黏膜再生；外层为中药珍珠层粉，碱式碳酸铋、氢氧化铝、颠茄流浸膏、叶绿素铜钠组成，其作用为中和胃酸、止痉止痛、保护黏膜。本品进入胃内后，外层迅速崩解，中和过多的胃酸，止痛，10 分钟后，内层药物逐渐溶化，珍珠层粉亦有协同修复创面之作用。

【贮藏】 密封保存。

【包装】 铝塑包装，每板 15 片，每袋 2 板，每小盒 1 袋；
塑料瓶装，每瓶 45 片，每小盒 1 瓶。

【有效期】 暂定 24 个月

【执行标准】 WS-10001-(HD-0364)-2002

【批准文号】 国药准字 H44024765

【说明书修订日期】 年 月 日

【生产企业】

企业名称：注册商标广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号

邮政编码：510515

质量服务电话：(020)87063679

销售服务电话：(020)87573176

传真号码：(020)87061075

网址：<http://www.byszc.com>

如有问题可与生产企业联系