

注册商标

OTC 标识

注册商标

羧甲司坦片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：羧甲司坦片

英文名称：Carbocysteine Tablets

汉语拼音：Suojiastan Pian

【成份】本品每片含羧甲司坦 250 毫克。辅料为：乳糖、羟丙纤维素、淀粉、羧甲淀粉钠、二氧化硅、硬脂酸镁。

【性状】本品为白色片。

【作用类别】本品为祛痰药类非处方药药品。

【适应症】用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。

【规格】0.25 克

【用法用量】口服。2~5 岁儿童一次 0.5 片，6~12 岁儿童一次 1 片，12 岁以上儿童及成人一次 2 片，一日 3 次。

【不良反应】可见恶心、胃部不适、腹泻、轻度头痛以及皮疹等。

【禁忌】消化道溃疡活动期患者禁用。

【注意事项】1. 用药 7 日后，如症状未缓解，应立即就医。

2. 有消化道溃疡史者慎用。
3. 2 岁以下儿童用量请咨询医师或药师。
4. 孕妇、哺乳期妇女慎用。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 应避免同时服用强镇咳药，以免痰液堵塞气道。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为粘液调节剂，主要作用于支气管腺体的分泌，使低粘度的唾液粘蛋白分泌增加，高粘度的岩藻粘蛋白产生减少，因而使痰液的粘稠性降低而易于咳出。口服起效快，服用 4 小时可见明显疗效。

【贮藏】密封，置阴凉（不超过 20℃）干燥处保存。

【包装】铝塑包装，每板 12 片，每小盒 1 板；铝塑包装，每板 12 片，每小盒 2 板。

【有效期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2015 年版二部

【批准文号】国药准字 H44023211

【说明书修订日期】 年 月 日

【生产企业】

企业名称：**注册商标**广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号

邮政编码：510515

质量服务电话：(020)87063679

销售服务电话：(020)87573176

传真号码：(020)87061075

网址：<http://www.byszc.com>

如有问题可与生产企业联系